




→ Embarazos no deseados

El cambio de conductas y roles entre adolescentes, prácticas sexuales cada vez más tempranas y la falta de información, hacen que las y los jóvenes tiendan a minimizar el riesgo de un embarazo no deseado o el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Así, la Encuesta de Salud 2006 de Castilla-La Mancha, muestra que un 12% de las y los jóvenes de entre 16 y 24 años no usa nunca anticonceptivos en sus relaciones sexuales o tan sólo en ocasiones. Por ello y desde hace décadas, las distintas administraciones trabajan en el diseño de campañas y programas de prevención, dirigidas a este grupo de población, con el objetivo de reducir a mínimos ese porcentaje.

Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2006 se practicaron 101.592 interrupciones voluntarias del embarazo en España. De ellos, 25.392 se efectuaron a mujeres de entre 20 y 24 años, seguidos de las mujeres de 25 a 29 años con un total de 25.320 abortos. El número de abortos en menores de 20 años ascendieron a 13.894. En Castilla-La Mancha se efectuaron un total de 2.716 interrupciones voluntarias del embarazo en 2006, 537 de ellas a mujeres menores de 20 años.

→ Enfermedades de transmisión sexual, VIH

Castilla-La Mancha continúa siendo la comunidad española con menor tasa de incidencia acumulada de SIDA desde el comienzo de la pandemia en 1981, con 773,2 casos por millón de habitantes, muy inferior a la media nacional, que se sitúa en 1.870 casos. Ocho de cada diez diagnosticados son varones, la mayoría entre los

Ocho de cada diez diagnosticados por VIH en la región son varones, la mayoría entre los 25 y los 39 años, frente a un 11% de mujeres.

25 y los 39 años, frente a un 11% de mujeres.

La adicción a las drogas está detrás del 65% de los casos de transmisión de la enfermedad, seguida por las relaciones heterosexuales (17%) y las homo y bisexuales (7%). Sin embargo, en las mujeres el contagio más habitual es el heterosexual, presente en un 33% de los casos femeninos, frente al 14% de los masculinos. Por el contrario, el contagio por drogas sigue siendo más alto entre los hombres (68% frente al 50% en las mujeres).

Las conductas de riesgo provocan que el 30% de las nuevas personas infectadas en España sean mujeres, presentes sólo en un 20% en los estudios clínicos de la epidemia. Ambos aspectos fueron denunciados recientemente en Madrid ⁽¹¹⁾, donde las y los expertos alertaron de las graves complicaciones a las que se exponen las mujeres contagiadas como son las infecciones vaginales, enfermedad inflamatoria pélvica y cáncer de cervix por virus del papiloma humano.

→ La mujer madura, menopausia vs. enfermedad

Especial atención merecen el climaterio y la menopausia, dos etapas más en la vida de las mujeres, que de manera habitual han sido tratadas si no como enfermedades, sí como procesos vitales penosos. El Informe Salud y Género 2006, apunta como causa de ello a la fusión que se hace de lo femenino a la función reproductiva. Ello, a su vez, lleva a considerar la experiencia vital de las mujeres unida a su ciclo fértil, y éste, a la reproducción y a la maternidad.

Esta identificación tradicional entre la sexualidad y las funciones reproductivas, ha llevado a la falsa creencia de que la llegada de la menopausia supone el fin de la sexualidad femenina. Además, ha tendido a ser representada como una enfermedad (síndrome menopáusico) y a ser relacionada con determinados síntomas psicoló-



(11) Conferencia SIDA y Mujer 2008.