



Río Tajo desde la pasarela de Poveda



Vado de Poveda

Los bosques de ribera aparecen tanto en las orillas de los ríos junto al agua como en toda la zona de influencia de estos, lo que se denomina vega. Estas suelen estar ocupadas por cultivos refugianse los bosques de ribera en estrechas bandas de vegetación de pocas decenas de metros a lo largo de los fondos de valle.

A continuación se describen los diferentes tipos de hábitat incluidos en el grupo de los bosques de ribera. Aunque todos ellos poseen una o varias especies arbóreas características en ellos aparecen numerosas especies vegetales integran la comunidad vegetal a la que se refiere el hábitat.

Abedulares.

Los abedulares son formaciones de abedules *Betula pendula*, que aunque frecuentes en la España húmeda donde se mezclan con hayas y robles, en la zona mediterránea con su característica sequía estival se refugia junto a cursos de agua y sus zonas de influencia. En el Alto Tajo encontramos un buen rodal en la "Fuente de las tobas" en Peñalén donde se mezcla con olmos de montaña, avellanos, acebos, tejos y álamos temblones. Además es frecuente en pequeños grupos junto al cauce desde este punto hasta las juntas con el río Hoz Seca. Los abedulares son indicadores del microclimas húmedos y fríos similares a los predominantes en el tercio norte de la península ibérica.

Alamedas y saucedas.

Estas formaciones, estrechamente ligadas a las riberas las podemos encontrar tanto mezcladas entre sí como en rodales puros con ejemplares aislados de la otra. Si bien ambas formaciones se encuentran junto al cauce, son los sauces los que suelen ocupar la primera banda de vegetación en contacto mismo con el agua. Las especies integrantes de estos hábitats son las diferentes especies de álamos *Populus nigra* y *Populus alba* para el caso de las alamedas, mientras que las saucedas están integradas por sauces o sargas como *Salix alba*, *Salix fragilis* y *Salix atrocinerea* entre otros. Una imagen muy típica del fondo de los cañones fluviales del Alto Tajo es el bosque de ribera compuesto por una primera banda de vegetación compuesta por sauces de porte arbustivo denominadas sargas (*Salix purpurea* y *Salix eleagnos*) a continuación de la cual aparece otra banda de vegetación integrada por álamos o chopos (*Populus nigra* y *P. alba*) mezclados con sauces blancos *Salix alba*. Estas formaciones de carácter caducifolio, durante el otoño, toman un color ocre que resalta esta formación ubicada en el fondo de los valles sobre el verde de los pinos.

TURBERAS Y ZONAS ENCHARCADAS DE MONTAÑA

Las turberas o trampales son zonas encharcadas localizadas en zonas frías lo que impide la rápida descomposición de la materia vegetal, que a su vez aumenta la acidez del suelo y su contenido en materia orgánica. Dichas circunstancias originan unos suelos con unas características edáficas muy especiales en las que sólo pueden vivir determinadas especies especialmente adaptadas a ellas. De todas ellas se trató en su día en el nº 6 de esta publicación, no obstante a continuación se describen los distintos tipos de turberas y hábitat similares que podemos encontrar en el Alto Tajo. Podemos encontrar turberas en la zona más altas del Alto Tajo, en su tercio sur oriental, a la sombra de pinares de pino silvestre de Checa, Orea, Chequilla, Alcoroches y Alustante.

