

Tercera campaña de vacunación

Campaña de vacunación contra la Meningitis C

El delegado de Sanidad, José Antonio Olmeda, junto a Margarita Bel, jefe del Servicio de Salud Pública y Matilde Chico, responsable de Epidemiología de la Delegación de Sanidad, presentaron la tercera campaña de vacunación contra la Meningitis C. La población de niños y jóvenes de entre 9 y 19 años podrán vacunarse hasta el 20 de febrero de 2004.

GEMA ORTEGA GAVILÁN

La Consejería de Sanidad, en colaboración con el SES-CAM, ha presentado, a través del delegado de Sanidad, José Antonio Olmeda, la tercera campaña de vacunación contra la Meningitis C. A partir del pasado 17 de noviembre y hasta el próximo 20 de febrero, los niños y jóvenes escolarizados, con edades comprendidas entre los 9 y 19 años, y también los no escolarizados que se encuentren en esta franja de edad, deberán ser vacunados contra la Meningitis C.

La vacuna conjugada, de la que se distribuirán 18.000 dosis en nuestra provincia, llegará a todos los Centros de Primaria, ESO, Bachiller y Formación Profesional, y también a los centros de salud de toda la provincia. El coste de estas 18.000 dosis es de 280.000

euros (46.000.000 ptas.); en Castilla-La Mancha se distribuirán 200.000 dosis. El presupuesto regional es de 2.800.000 euros (465 millones de pesetas).

La vacuna conjugada frente al meningococo C es capaz de generar altos niveles de anticuerpos e inducir memoria inmunológica, es decir, que la protección es duradera en el tiempo. En los niños mayores de 2 años se ha demostrado que una única dosis existente es suficiente para generar inmunidad. Esta vacuna tiene una efectividad muy alta. "La meningitis es una enfermedad grave, cuyo mecanismo de transmisión es por contacto directo a través de secreciones de las vías nasales y faríngeas de sujetos afectados", explicó Olmeda.

La vacunación realizada en el año 1997 con la vacuna polisacárida ha perdido su efectividad después de



De izquierda a derecha, Matilde Chico, responsable de Epidemiología, José Antonio Olmeda, delegado de Sanidad y Margarita Bel, jefe del servicio de Salud Pública.



Manchas en la piel causadas por la Meningitis.

los cinco años transcurridos. Por ello, los niños y jóvenes que se vacunaron en 1997 con la vacuna polisacárida deberán volver a ser vacunados con la vacuna conjugada.

Descripción

La enfermedad meningocócica es una enfermedad bacteriana producida por *Neisseria meningitidis*, que se caracteriza por un comienzo repentino de fiebre, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, rigidez de nuca y frecuentemente erupción petequeal. Puede cursar como meningitis, como infección generalizada en la sangre (sepsis) o como en ambas simultáneamente. Se conocen 13 serogrupos de *Neisseria meningitidis*. «En Europa y América los serogrupos B

y C representan la mayoría de los casos notificados. La mayor parte de los casos son aislados, es decir, no tienen relación entre sí, principalmente para la EM por serogrupo B, mientras que la EM C puede manifestarse con mayor frecuencia como casos agrupados» apuntó Matilde Chico.

Transmisión

El mecanismo de transmisión es por contacto directo a través de secreciones de las vías nasales y faríngeas de sujetos infectados. Los portadores sanos tienen la bacteria en su garganta pero no sufren la enfermedad y son ellos los que transmiten generalmente la EM. El contagio requiere un contacto estrecho y prolongado. Es recomendable por eso, unas medidas higiénicas.