


El arqueólogo Santiago BRONCANO supone que los restos que quedaban del Castellar de Meca fueron destruidos por el terremoto de 1 de noviembre de 1755, para lo cual alude a un artículo mío (RODRÍGUEZ DE LA TORRE, 1982) en el que no formulé la intensidad que me atribuye para Almansa<sup>3</sup>.

Los sismos que se han sentido en la provincia de Albacete corresponde, según mi análisis, a dos tipos de epicentros: aquellos que tienen su foco dentro del territorio provincial y entonces podemos hablar de terremotos *autóctonos*, y aquellos sismos sentidos en la provincia, pero cuyos epicentros están fuera de la misma, a veces a cientos de kilómetros, y entonces los denominamos terremotos *alóctonos*.

Después de haber investigado por mi cuenta los sismos históricos o pre-instrumentales y de recoger la oportuna y científica información del banco de datos sísmicos del Servicio Sismológico Nacional<sup>4</sup> puedo publicar por vez primera la siguiente relación.



Mapa de isosistas del sismo de Chinchilla, del 20 de marzo de 1933. (Del *Catálogo general de isosistas*).

<sup>3</sup> BRONCANO, S. *El Castellar de Meca. Ayora, Valencia*. Madrid, 1986, p. 47.

<sup>4</sup> Agradezco al ingeniero geógrafo, alcaracense, J. M. MARTÍNEZ SOLARES, Jefe del Servicio Sismológico del IGN la relación actualizada de sismos albacetenses autóctonos, del siglo XX, que me ha facilitado. La intensidad, en su mayor parte, es hipótesis mía.