

- Tellería, J.L. 1986. Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Editorial Raíces, Madrid.
- Tucker, G.M. & Heath, M.F. 1994. Birds in Europe: their Conservation Status. BirdLife Conservation Series 3. BirdLife International. Cambridge.
- Village, A. Factors limiting European Kestrel numbers in different habitats. En, R. Chancellor (Ed.): Raptors in the Modern World, pp. 193-302. World Working Group on Birds of Prey and Owls, London.
- Woutersen, K. 1986. Censo de rapaces desde vehículo en la provincia de Huesca. *Boletín del Grupo Ornitológico Oscense*, 3: 13-22.

AGRADECIMIENTOS

A todos aquellos que emplearon su tiempo y esfuerzo en la realización de este censo: V. Benlloch, D. Blanco, D. Bueno, L. Cifuentes, M. Escribano, A.J. González, M. López, A. Nuñez y J.M. Reolid. Y también a aquellos que, con la intención de participar en el censo, no pudieron hacerlo finalmente.

Para la realización del presente estudio se contó con una ayuda de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Orden de 29 de febrero de 1996 de ayudas para el desarrollo de programas, proyectos y actividades medioambientales).

Tabla 1.- Resumen de los resultados según los diferentes recorridos (Cc *Circus cyaneus*, An *Accipiter nisus*, Bb *Buteo buteo*, Ac *Aquila chrysaetos*, Ft *Falco tinnunculus*, Fc *Falco columbarius*, Fp *Falco peregrinus*, Mo *Athene noctua*, In indeterminados).
[Summary of results by itineraries]

| RECORRIDO | Km | Cc | An | Bb | Ac | Ft | Fc | Fp | Mo | In | Total |
|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1 | 107 | | 1 | | | 2 | | | | | 3 |
| 2 | 120 | 1 | | | | 4 | | | 2 | | 7 |
| 3 | 169 | | | 2 | | 8 | | | | 1 | 11 |
| 4 | 136 | | | | | | 2 | 1 | | | 3 |
| 5 | 207 | | | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | 8 |
| TOTAL | 739 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 32 |

Tabla 2.- Resumen de los resultados. Se incluyen los IKAs obtenidos por de Juana & cois. (1988) y Sunyer & Viñuela (1996). (Cc *Circus cyaneus*, An *Accipiter nisus*, Bb *Buteo buteo*, Ac *Aquila chrysaetos*, Ft *Falco tinnunculus*, Fc *Falco columbarius*, Fp *Falco peregrinus*, Mo *Athene noctua*).
[Summary of results. IKAs from de Juana et al. (1988) and Sunyer & Viñuela (1996) are included.]

| ESPECIES | Cc | An | Bb | Ac | Ft | Fc | Fp | Mo |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Nº de observaciones | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 |
| Frecuencia | 3.13 | 3.13 | 9.38 | 3.13 | 53.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 |
| % cuadrículas ocupadas | 4.35 | 4.35 | 8.70 | 4.35 | 39.13 | 8.70 | 4.35 | 8.70 |
| IKA | 0.09 | 0.32 | 0.22 | 0.08 | 2.76 | 0.45 | 0.22 | 0.20 |
| IKA Iberia (de Juana & cols. 1988) | 0.10 | 0.20 | 4.50 | 0.20 | 5.10 | 0.20 | 0.10 | - |
| IKA España (Sunyer & Viñuela 1996) | 0.49 | - | 7.50 | - | 6.80 | 0.14 | - | - |