

RECOGIDA DE LECHE EN GRANJA

DÍA	LITROS	TEMP. °C	OBSERVACIONES
1	893		00531
2			
3	904		00532
4			
5	898		00533
6			
7	868		00534
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

DÍA	LITROS	TEMP. °C	OBSERVACIONES
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

CABRA

LILCAM

TAPA

TRANSVERSAL

6720480534

00534

Imagen 5

RECOGIDA DE LECHE EN GRANJA

DÍA	LITROS	TEMP. °C	OBSERVACIONES
1	893		00531
2			
3	904		00532
4			
5	898		00533
6			
7	868		00534
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

DÍA	LITROS	TEMP. °C	OBSERVACIONES
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

CABRA

LILCAM

TAPA

TRANSVERSAL

6720480534

00534

Imagen 6

Por otra parte, en el boletín mensual que emite el LILCAM donde se recogen todos los resultados de los análisis del mes, también aparecerá, junto al resultado, el número de serie de la muestra que le tomaron al ganadero el día determinado, con lo cual éste, en todo momento, puede comprobar en su cartilla si el número de la muestra corresponde con la muestra tomada en su explotación ese día y analizada en el laboratorio.



Imagen 7

Innovando para mejorar tu rentabilidad




NOVEDAD
¡Única
Prostaglandina
registrada en ovino!

Consulta con tu técnico

Ceva

SINCRONAUT 30 mg. Esporjas vaginales. **Composición por esporja:** Acetato de flugestona 0,030 g. **Indicaciones de uso:** Inducción y sincronización del estró en ovinos en anestro fisiológico. Sincronización del celo en ovinos y cabras en estación reproductiva. **Contraindicaciones:** Animales que hayan mostrado hipersensibilidad a la flugestona. No administrar a ovinos que presenten flujo vaginal o que estén enfermos. **Advertencias especiales:** Las ovinas deben estar sexualmente maduras y en buenas condiciones físicas. Si se utilizan en preñados, estas han de tener al menos 7 meses de edad y pesar como mínimo el 70 % de su futuro peso de adultas. Cuando la aplicación de las esporjas en cordón sea difícil, se debe utilizar un método alternativo. **Precauciones especiales para su uso en animales:** El medicamento es estéril. Rasgar con cuidado a lo largo de las perforaciones para abrir cada una de las partes del blister cuando se necesiten. Evitar el deterioro de los implantes. Para la implantación, utilizar únicamente agujas en buen estado. Respetar las condiciones usuales de higiene durante la implantación. **Reacciones adversas:** Ninguna. **Tiempo de espera:** Carne y leche: cero días. **Título:** Ceva Santé Animale - 10 avenue de la Battahéry - 33000 Libourne, Francia. **Reg. nº:** 1274 ESP. **PROSYL** Solución inyectable. **Composición por ml:** Prostaglandina F2α 5 mg. **Especies de destino:** Vacas, Cerdas, Yeguas, Ovinos. **Indicaciones de uso:** Ovinos: Inducción o sincronización del estró. **Contraindicaciones:** No se debe administrar a animales con alteraciones digestivas, reproductivas o circulatorias. No usar simultáneamente antipiréticos no esteroides pues suprimen la acción y eficacia de la PGF2α. No administrar por vía intravenosa. **Advertencias especiales:** Inyectar de forma aséptica, dentro del alto riesgo de contaminación bacteriana en el punto de inoculación. **Reacciones adversas:** A veces, molestias en la región, una elevación transitoria de la temperatura corporal, náuseas, fatiga, inapetencia y salivación pueden presentarse. Estos signos pueden aparecer a los 15 minutos de la inyección y remitir sin intervención alguna ni consecuencias como máximo al cabo de una hora. **Tiempo de espera:** Carne: 2 días. Leche: 1 día. **Representante del Titular:** Ceva Salud Animal - Caraballa La Niña, 12 - 08017 Barcelona. **Reg. nº:** 1009 ESP.

Ceva Salud Animal S.A. - www.ceva.es - ceva.salud-animal@ceva.com Caraballa La Niña, 12 - 08017 Barcelona - Tel.: 902 36 72 18 - Fax: 902 19 72 41