

Cabe destacar que:

- El mes con mayor nº partos recogidos fue enero, un 14% de las ovejas se cubren en agosto.
- El mes con menor nº partos fue julio, tan solo un 5,9% de las ovejas se cubren en febrero. (Anestro Estacional).
- En el invierno pare un 34% de los animales, que responde a la época favorable de cubrición de Agosto a Octubre. Este hecho diferencia a la Primavera como la principal estación de recogida de leche
- Por el contrario la estación con menos partos es el verano (julio, agosto y septiembre), por la baja fertilidad de los meses febrero, marzo y abril (Anestro Estacional)

2.- Distribución estacional de los partos de las hembras primíparas.

En el Cuadro 1 podemos observar la distribución de la dinámica de partos en el periodo de estudio

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
PROMEDIO	47%	24%	10%	19%

Cuadro 1. Distribución estacional de los partos de las hembras primíparas.

Aproximadamente la mitad de la reposición dejada entre 2010 y 2011 paren en el primer trimestre del año (independientemente de su época de nacimiento), consecuencia del Anestro Estacional y de no realizar rutinariamente manejos hormonales en la explotación para mejorar la inducción y

sincronización de celo en esta época. Por otro lado la mejor época de cubrición de los animales de primer parto transcurre de Agosto a Octubre.

3.- Distribución de los partos atendiendo a la edad del primer parto y a la época de nacimiento:

En el Cuadro 2, se evidencia el distinto comportamiento reproductivo de los animales dependiendo de la estación

Estación	% Rep.	EDAD MEDIA del Primer Parto	%Paridas < 18 meses	%Paridas > 18 meses
1º - Invierno	34 %	15,1	86%	14%
2º - Primavera	22 %	17,2	58%	42%
3º - Verano	22%	17,3	50%	50%
4º - Otoño	22%	16,2	83%	17%
		16,1	69%	31%

del año de nacimiento:

Cuadro2. Comportamiento reproductivo de los animales dependiendo de la estación del año de su nacimiento.

Podemos observar cómo las corderas más precoces son las nacidas en el invierno pues alcanzan su pubertad en la época favorable de cubrición (VERANO - OTOÑO) del mismo año aunque manteniendo una edad media al primer parto superior a lo que consideramos ideal (15,1 frente a 12-13 meses) lo que indica la dificultad que supone cubrir este tipo de animales sin ningún tipo de manejo adicional.

Por su parte, las nacidas en verano son las menos precoces al alcanzar su pubertad en época desfavorable (INVIERNO - PRIMAVERA), por lo que su cubrición se retrasa



Trabajamos para el desarrollo del sector de los pequeños rumiantes

