



Sabina Rastrera



Enebro



Erizal

La comunidad suele estar dominada por la especie conocida como erizo o cojín de monja (*Erinacea anthyllis*), que suele estar acompañada o incluso dominada por la *Genista pumila rigidísima*, que es una especie con un aspecto más robusto que su pariente la aliaga (*Genista scorpius*). Este tipo de formación aparece también con otro tipo de sustratos, como son las andesitas (rocas de origen volcánico), donde la especie característica es el *Astragalus granatensis*.

Se asientan sobre suelos esqueléticos conocidos como litosuelos (rocosos), y localizadas en situaciones expuestas a vientos permanentes. Tienen una fisonomía muy peculiar y tienen el carácter de vegetación permanente en las zonas donde se asientan. Su uso tradicional ha sido el pastoreo extensivo con ganado lanar.

Se localizan preferentemente en los altos páramos calizos de Checa, Chequilla, Peralejos de las Truchas, Poveda de la Sierra, Peñalén y Zaorejas principalmente; y en Orea, el tipo que se desarrolla sobre andesitas (roca de origen volcánico).

Sabinares rastreros oro(sub)mediterráneos.

Es un tipo de matorral que se desarrolla sobre suelos calizos poco desarrollados por encima de los 1.500 m. de altura. Se encuentra dominado por la sabina rastrera (*Juniperus sabina*) y por el enebro

(*Juniperus communis hemisphaerica*), entre los cuales aparecen la arlera (*Berberis vulgaris seroi*), rosas silvestres (*Rosa sp.*), endrinos (*Prunus spinosa*), majuelo (*Crataegus monogyna*), gillomo (*Amelanchier ovalis*) o también el boj (*Buxus sempervirens*). En las zonas con mejor suelo, aparecen en rodales o ejemplares sueltos del pino albar (*P. sylvestris*), el pino

negral (*P. nigra*), así como encina (*Q. ilex*) o quejigo (*Q. faginea*). Si las características del suelo son mejores, es sustituida la comunidad por el pino albar.

Es un tipo de matorral típico de la alta montaña ibérico-levantina caliza, con una fisonomía peculiar y muy original, marcando una señal de identidad a estos parajes. Tiene gran interés paisajístico, mostrando paisajes salpicados de manchas que recuerdan a la piel de un leopardo.

Tradicionalmente es empleado por el ganado lanar que aprovecha los pastos que se desarrollan entre la formación.

Se localizan en Checa, Chequilla, Orea, Alcoroches y Peralejos de las Truchas principalmente. Las mejores formaciones dentro del Parque Natural se encuentran en Sierra Molina.

Sabinares albares.

Son comunidades dominadas por la sabina albar (*Juniperus thurifera*), características de zonas con clima continental, sobre suelos poco desarrollados, litosuleos, con poca capacidad de retención de agua, de tal modo que la sabina es probablemente la única especie arbórea que sobrevive en estas condiciones.

Son formaciones generalmente abiertas, con poca densidad. En las situaciones más extremas es la especie dominante, pero en condiciones más favorables compete y se mezcla con los *Quercus* (robles y encinas)

y con los pinos, con los cuales suele encontrarse mezclada.

Suelen acompañar a la sabina los enebros (*Juniperus communis hemisphaerica*), las arleras (*Berberis vulgaris seroi*), rosas (*Rosa sp.*), las especies típicas del matorral pulvinular.

Es un tipo de bosque abierto con gran originalidad y estética que tiene gran importancia para la conservación de determinadas especies de aves. Es un tipo de bosque adaptado al pastoreo extensivo de ganado lanar.

Desde el punto de vista etnográfico, son destacables los chozones ganaderos que tienen como material básico para su construcción la sabina (viguería y cubierta), así como servir incluso de pilar central y soporte de toda la estructura, ofreciendo una tipología de estructuras y soluciones constructivas verdaderamente admirables y dignas de conservar.

Destaca la durabilidad de su madera, su aroma, así como su veteado, características sobradamente conocidas por los carpinteros, lo cual hace que sea una madera muy apreciada. En la actualidad, es una especie de aprovechamiento regulado, estando permitido de una forma acorde a su capacidad de regeneración, que es muy lenta por el reducido crecimiento de la especie.

Los sabinares en el Alto Tajo son muy abundantes, sobre todo en la zona de Baños de Tajo, Valhermoso, Fuembellida, Escalera, Cuevas Labradas, Olmeda de Cobeta, Ablanque, Riba de Saelices, Buenafuente del Sistol, Zaorejas,.....

Respecto a las construcciones típicas o chozones salineros, las mejores se encuentran en Ablanque, Olmeda de Cobeta, y la zona de Valhermoso y Escalera.

Arbustadas caducifolias espinosas submediterráneas.

Se trata de formaciones vegetales generalmente densas y altas, a veces como sotobosque de pinares, quejigares, acerales, bosques eurosiberianos, choperas o saucedas en las que abundan los majuelos, endrinos y otros arbolillos o grandes arbustos caducifolios, en su mayoría espinosos y productores de bayas.

